



Coeliakie bij kinderen



33.600

In Nederland hebben zo'n 33.600 kinderen coeliakie.

Wat is coeliakie?

Coeliakie is een auto-immuunziekte die wordt geactiveerd door het eten van gluten. Gluten is een eiwit dat van nature voorkomt in tarwe, rogge en gerst. Gluten zit ook in producten die van deze granen zijn gemaakt.

1 op 8

Coeliakie komt voor op iedere leeftijd, ook bij baby's vanaf het moment dat hun voeding gluten bevat. Bij slechts van 1 op de 8 kinderen in Nederland met coeliakie is de diagnose coeliakie vastgesteld.

Symptomen van coeliakie bij kinderen

 Chronische diarree of obstipatie	 Chronische buikpijn en opgezette buik	 Herhaaldelijk overgeven	 Vermoeidheid en prikkelbaarheid	 Aften in de mond.	 Groeiproblemen
--------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------	--------------------

Kijk voor meer informatie over coeliakie en glutenvrij leven op www.glutenvrij.nl

Zo werkt de Glutenscreen studie

De Glutenscreen studie is bedoeld om coeliakie vroegtijdig op te sporen bij kinderen **tussen de 12 maanden en 4 jaar**. Dat gebeurt op de consultatiebureaus in de regio Kennemerland. Hoe eerder we coeliakie opsporen hoe beter we de gevolgen van deze ziekte, zoals een tekort aan ijzer en andere voedingsstoffen of een groeiachterstand, kunnen voorkomen.

1. Uitnodiging deelname onderzoek

Ouders van alle kinderen tussen de 12 maanden en 4 jaar die het consultatiebureau in de regio Kennemerland bezoeken, zullen worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.

OUDER(S) DOEN NIET MEE

GEEN VERVOLG

OUDER(S) DOEN MEE

2. Vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit een aantal vragen die te maken hebben met coeliakie. Bijvoorbeeld: "Heeft u kind langer dan 3 weken last van buikpijn?"

ALLE VRAGEN MET 'NEE' BEANTWOORD EN GEEN GROEIACHTERSTAND.

GEEN MOGELIJKHEID VOOR DEELNAME GLUTEN-SCREEN

1 OF MEER VRAGEN MET 'JA' BEANTWOORD EN/OF GROEIACHTERSTAND



3. Uitnodiging vingerprik

De ouders wordt gevraagd toestemming te verlenen voor een vingerprik bij hun kind. Hiervoor wordt een vervolgspraak gemaakt.

OUDERS GEVEN GEEN TOESTEMMING

GEEN VERVOLG

BEIDE OUDERS GEVEN TOESTEMMING

4. Vingerprik

Met behulp van een vingerprik op het consultatiebureau kan in één druppel bloed de aanwezigheid van coeliakie-antistoffen worden aangetoond. De kans hierop is ongeveer 2%.

GEEN COELIAKIE-ANTI-STOFFEN

GEEN DIAGNOSE COELIAKIE OP DIT MOMENT



WEL COELIAKIE-ANTI-STOFFEN

EVENTUEEL AFSpraak MET JEUGDARTS I.V.M. AANGEGEVEN KLACHTEN.

5. Vervolgonderzoek

Indien coeliakie-antistoffen in het bloed aanwezig zijn, neemt een verpleegkundige van het LUMC binnen 48 uur contact op om eventuele vragen te beantwoorden. Binnen 3 weken zal voor verder onderzoek een afspraak plaatsvinden op de polikliniek kindergeneeskunde in het LUMC.

GEEN DIAGNOSE COELIAKIE

WEL DIAGNOSE COELIAKIE

6. Afspraak bij diëtist voor glutenvrij dieet


Coeliakie kan goed behandeld worden. Een levenslang glutenvrij dieet heeft een positief effect op de gezondheid en de kwaliteit van leven van kinderen met coeliakie.



7. Controle

Nadat het kind een tijd lang het glutenvrij dieet heeft gevolgd, wordt het kind gewogen en zal de kinderarts in het LUMC het kind ter controle aan de hand van een bloedprik onderzoeken hoeveel coeliakie-antistoffen in het bloed aanwezig zijn.

AFNAME ANTI-STOFFEN



DOOR-VERWIJZING NAAR KINDERARTS VAN REGIONAAL ZIEKENHUIS.

LEVENSLANG VOORTZETTEN VAN DIEET.

Indien u vragen heeft over de Glutenscreen studie kunt u contact opnemen met Wilma Ninaber- de Jong of Yvonne Wijkhuisen. U kunt ook een email sturen naar glutenscreen@lumc.nl.



Kijk voor meer informatie over de Glutenscreen studie op glutenscreen.nl